



Ponencia Oral

## Comportamiento alimentario del Cocolí (*Theristicus caudatus*) en el Valle del Cauca

ELIANA FIERRO-CALDERÓN\* (Universidad del Valle)

Un elemento importante en el estudio de las especies es el conocimiento de la dieta, ya que permite identificar requerimientos ecológicos de la especie. Se estudiaron los hábitos alimentarios del Cocolí en la Reserva Natural El Hatico en el Valle del Cauca, expresados en selección de hábitat, estrategias de forrajeo y tipo de dieta. Se encontró que los Cocolíes prefieren potreros silvopastoriles y cañaduzales de vegetación baja sobre otros sistemas de producción dentro de la Reserva, y sus sitios de forrajeo variaban según la disponibilidad de hábitat y alimento. Forrajeaban principalmente en parejas y presentan actividad de forrajeo durante todo el día con dos picos entre 1000-1100 y 1500 hrs. Se alimentan de artrópodos, principalmente insectos, y las hormigas hacen parte importante de su dieta; también pueden llegar a alimentarse de vertebrados pequeños.

Palabras claves: *Theristicus caudatus*, hábitat, forrajeo, dieta

[eli.fierro@gmail.com](mailto:eli.fierro@gmail.com)

Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultado 2 en el incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas, contenida en la Estrategia Nacional para la Conservación de las aves.